


# ការរកឃើញរោគមហារីកពោះទៀនដំបូង



រោគមហារីកពោះទៀន (គេក៏ស្គាល់ថា colorectal cancer) គឺជាជំងឺមហារីកដ៏សាមញ្ញដែលកើត

មានច្រើនជាងគេបំផុតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី (ក្រៅពីរោគមហារីកស្បែកសាមញ្ញ) ។

គេអាចរកឃើញរោគមហារីកពោះទៀនដំបូងបាននៅពេលដែលការព្យាបាលប្រមូលជាអាចធ្វើឱ្យម្ចីនេះជាសះស្បើយបាន ។

វាក៏មានវិធានការខ្លះៗដែលលោកអ្នកអាចចាត់ការបាន ដើម្បីជួយបង្ការការកើតរោគមហារីកពោះទៀនរបស់លោកអ្នក ។

## តើពោះទៀនជាអ្វី?

ពោះទៀនគឺជាភាគនៃបំពង់វិលាមហារីកមួយដែលបំផុត (digestive tract) ។ វាមាន ២ ផ្នែក ៖

- ពោះទៀនតូច, ជាកន្លែងដែលស្រូបយកម្ហូបអាហារចូល ។
  - ពោះទៀនធំ, ជាកន្លែងដែលស្រូបយកទឹកនិងអំបិលចូល ។
- ពោះទៀនធំគឺមាន ២ ភាគ-ពោះទៀនធំ (colon)  
 ហើយនិងចុងពោះទៀន (rectum) ។

## តើរោគមហារីកពោះទៀនជាអ្វី?

រោគមហារីកពោះទៀនគឺជាសារធាតុដែលកើតមាននៅក្នុងពោះទៀនតូច ឬ ធំ ។

វាអាចរីកធំនៅទីនេះយ៉ាងយូរមុននឹងវាពង្រីកទៅភាគផ្សេងៗ ទៀតនៃដងខ្លួន (metastasising) ។

ហេតុនេះហើយបើការរកឃើញរោគមហារីកពោះទៀននៅ ដំណាក់កាលដំបូងកាន់តែបានឆាប់ សំណាងនៃការព្យាបាលឱ្យជា សះស្បើយ ក៏កាន់តែល្អប្រសើរឡើងដែរ ។

ភព្វសំណាងនៃការជាសះស្បើយ គឺមាន ៩០% ប្រសិនបើរោគ មហារីកពោះទៀនត្រូវបានគេរកឃើញនៅដំណាក់កាលដំបូង ។

## តើរោគមហារីកពោះទៀនមានជាទូទៅយ៉ាងដូចម្តេចដែរ?

រោគមហារីកពោះទៀនគឺជារោគមហារីកដែលកើតមានច្រើនជាងគេបំផុត ហើយប៉ះពាល់ដល់បុរស និងស្ត្រីស្មើគ្នាខ្លះៗ ។

ប្រជាជនចំនួនជាងមួយភាគបីត្រូវបានគេធ្វើតេស្តរកឃើញរោគមហារីកពោះទៀន ។

## តើនរណាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដោយរោគមហារីក ពោះទៀន?

រោគមហារីកពោះទៀនអាចកើតមានគ្រប់អាយុកាល, ក៏ប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ មានកាន់តែច្រើនឡើងទៀត ប្រសិនបើលោកអ្នកមានអាយុលើស ពី ៥០ឆ្នាំ ។

## បំពង់វិលាមហារីក

គ្រោះថ្នាក់របស់លោកអ្នកក្នុងការកើតរោគមហារីកពោះទៀនក៏កាន់ តែកើនឡើងទៀត ប្រសិនបើ ៖


- លោកអ្នកមានប្រវត្តិគ្រួសារដែលមានរោគមហារីកពោះទៀន ។
  - លោកអ្នកមានជំងឺរោគពោះទៀនខ្លាំង (ulcerative colitis or Crohn's colitis) ជាដង្ហាមកហើយ។
- ប្រសិនបើកត្តាទាំងនេះទាក់ទងចំពោះលោកអ្នក, សូម និយាយប្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិតលោកអ្នកអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃរោគ មហារីកពោះទៀនរបស់លោកអ្នក ។

## រោគសញ្ញានៃរោគមហារីកពោះទៀន

មិនមែនរោគមហារីកពោះទៀនទាំងអស់ទេដែលបង្ហាញរោគសញ្ញា ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកគួររងការពិនិត្យលោកអ្នក

ប្រសិនបើលោកអ្នកសង្កេតឃើញអ្វីមួយដូចតទៅនេះ ៖

- ការចេញឈាមនៅក្នុងថង់របស់លោកអ្នក ឬសញ្ញាឈាមណាមួយនៅក្រោយបទដងធ្មេញ ។
- ការផ្លាស់ប្តូរមិនល្អបំផុតបទដងធ្មេញ: ដូចជា ការបទដងធ្មេញមិនទ្រាំទ្រ ឬច្រើនដង, ដំណើរ ទល់លាមកកាន់តែកើនឡើង, និង/ឬ ការទៅបង្គន់ញឹកញាប់ ជាងធម្មតា ។
- លោកអ្នកមានអារម្មណ៍ដូចបទដងធ្មេញមិនអស់សោះ ។
- ការអស់កម្លាំង, ខ្សោយ ឬជិកជងដើមមិនដល់គ្នាដែលមិនអាចពន្យល់បាន ។
- ទាំងអស់នេះប្រហែលមកពីកង្វះឈាមក្រហមដែលបណ្តាលមក ពីការខ្វះជាតិដែក ។ ប្រសិនបើកង្វះឈាមក្រហមនេះអាច ជាហេតុនៃរោគមហារីកពោះទៀន ។
- ការឈឺចុកពោះ ។
- ស្រកទម្ងន់ដោយគ្មានហេតុអ្វីពិតប្រាកដ ។



## ► Khmer

### Finding Bowel Cancer Early

ព័ត៌មានអំពីរោគមហារីកពោះទៀន  
 បានតាមរយៈផ្នែកបកប្រែភាសា ។

សូមទូរស័ព្ទលេខ 13 14 50  
 ហើយស្នើសុំការបន្តទៅលេខទូរ  
 ស័ព្ទខាងក្រោមដើម្បីយល់ពីរោគមហារីក  
 លេខ 13 11 20

202 Greenhill Road  
 Eastwood SA 5063  
 Telephone (08) 8291 4111  
 Facsimile (08) 8291 4122  
 tcc@cancersa.org.au  
 www.cancersa.org.au

August 2005

# ការអភិវឌ្ឍន៍ការពារជំងឺពោះវៀនដំបូង



អ្នកដែលមានអាយុលើសពី ៤០ឆ្នាំ គួរប្រុងប្រយ័ត្នមើលសញ្ញា ព្រមាននៃរោគមហារីកពោះវៀន ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានរោគសញ្ញាណាមួយ, សូមជួបវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នកដែលនឹងបញ្ជូនលោកអ្នកទៅធ្វើតេស្តឈាមដើម្បីមើលរោគមហារីកពោះវៀន ។ តាមធម្មតាវាមានការពន្យល់ដ៏សាមញ្ញមួយ, ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើវាជា រោគមហារីកពោះវៀនមែន, វាជាការល្អបំផុតដែលគេរកឃើញវាមុន ។

## ការឆ្លុះមើលរោគមហារីកពោះវៀន

ការឆ្លុះមើលរោគមហារីកពោះវៀនទាក់ទងនឹងការធ្វើតេស្តប្រជាជន ដែលគ្មានរោគសញ្ញាដ៏ជាក់ស្តែងនៃរោគមហារីកពោះវៀនណាមួយ ឡើយ ។ ការឆ្លុះមើលដោយធ្វើតេស្តឈាមនៅក្នុងលាមក (Faecal Occult Blood Test )

ត្រូវបានធ្វើឡើងទាក់ទងនឹងការប្រជាជនដែលមានសុខភាពល្អ ហើយនិង មានអាយុលើសពី ៥០ឆ្នាំ ។

## តេស្តឈាមនៅក្នុងលាមក (FOBT)

FOBT គឺជាតេស្តដ៏សាមញ្ញមួយសំរាប់រកសញ្ញាដំបូងនៃរោគមហារីកពោះវៀន ។ វាទាក់ទងនឹងការយកសំណាកលាមក ២២៣ ដងដោយ ប្រើប្រដាប់សំរាប់តេស្ត ។ គេមកយកសំណាកនេះពីផ្ទះលោកអ្នក ហើយបញ្ជូនវាទៅទីពិសោធន៍សំរាប់ធ្វើតេស្ត ។

FOBT នឹងរកមើលឈាមមួយចំនួនតូចបំផុតដែលមាននៅក្នុង លាមកនោះ (ឈាមដែលមិនអាចមើលឃើញដោយភ្នែកលោកអ្នក) ។ ឈាមដែលមាននៅក្នុងលាមកអាចបណ្តាលមកពីសាច់ដុះ (ដ៏សាច់ដុះនៅក្នុងពោះវៀនដែលអាចកើតទៅជារោគមហារីក) ឬរោគមហារីកពោះវៀនដែលចេញឈាម ។

ប្រសិនបើគេរកឃើញឈាមនៅក្នុងលាមក, គេត្រូវការធ្វើ តេស្តថែមទៀតដើម្បីរកមើលអ្វីដែលបណ្តាលឲ្យចេញឈាម ។ សូមចាំថា, រោគមហារីកពោះវៀនអាចជាសះស្បើយបានច្រើន (៩០%) ប្រសិនបើគេរកឃើញនៅដំណាក់កាលដំបូង ។ ហើយសាច់ដុះដែលគេរកឃើញតាមរយៈ FOBT នោះ, ក៏គេអាចយកវាចេញនៅមុនពេលដែលវាអាចកើតទៅជារោគ មហារីក ។

## តើខ្ញុំអាចធ្វើ (FOBT) នៅទីណាបាន?

បុរសនិងស្ត្រីដែលមានអាយុលើសពី ៥០ឆ្នាំទៅ គួរតែជួបវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ខ្លួនស្តីពី (FOBT) រៀងរាល់ពេល ២ឆ្នាំម្តង ។

## ការបន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃរោគមហារីកពោះវៀន

លោកអ្នកអាចជួយបន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃរោគមហារីកពោះវៀនរបស់ លោកអ្នកបានដោយ ៖

- ទទួលបានអាហារដែលធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អ, រាប់បញ្ចូលបន្លែនិងផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនហើយ និងខ្លាញ់តិចតួចបំផុត ។
- រក្សាទម្ងន់ខ្លួនដែលផ្តល់សុខភាពល្អ
- ហាត់ប្រាណឲ្យទៀងទាត់
- កុំពិសារបារី ។

ដោយធ្វើតាមឱវាទទាំងនេះ, វាមិនមានន័យថាលោកអ្នកនឹងមិន មានរោគមហារីកពោះវៀនសោះទេ, ក៏ប៉ុន្តែវាអាចជួយបន្ថយគ្រោះថ្នាក់ របស់លោកអ្នកហើយនិងបានប្រយោជន៍ខាងសុខភាពទៀតផងដែរ ។

## ► Khmer

### Finding Bowel Cancer Early

ព័ត៌មានអំពីរោគមហារីកពោះវៀន បានតាមរយៈអ្នកបកប្រែភាសា ។

សូមទូរស័ព្ទលេខ 13 14 50 ហើយស្នើសុំការបន្តទៅលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមដើម្បីទាក់ទងនឹងរោគមហារីក លេខ 13 11 20

202 Greenhill Road  
Eastwood SA 5063  
Telephone (08) 8291 4111  
Facsimile (08) 8291 4122  
tcc@cancersa.org.au  
www.cancersa.org.au

August 2005